



REPRODUÇÃO

# Contralac<sup>®</sup> 5

**ANTIGALACTOGÊNICO NÃO HORMONAL  
PARA CADELAS E GATAS**

## USO VETERINÁRIO

### ■ PROPRIEDADES

A metergolina é um derivado sintético do Ergot, com ação antagonista serotoninérgica a nível de receptores no sistema nervoso autônomo. Ela atua inibindo competitivamente os receptores de serotonina no hipotálamo, o que leva a uma inibição da secreção de prolactina pela hipófise e, conseqüentemente à interrupção da produção do leite pelas glândulas mamárias. A metergolina é rapidamente absorvida após administração oral, alcançando concentrações plasmáticas terapêuticas duas horas após a administração. Sua metabolização ocorre a nível hepático, e a eliminação - relativamente lenta, em torno de doze horas - ocorre 90% através das fezes (excreção biliar) e 10% através da urina.

Administrado à dose terapêutica de 0,2 mg/kg de peso corporal/dia, CONTRALAC<sup>®</sup> 5 induz à regressão dos sintomas indesejáveis encontrados na lactação da pseudogestação (aumento de volume das mamas, produção de leite e alterações de comportamento) e à interrupção da lactação do pós-parto.

### ■ FÓRMULA

Cada comprimido contém:

Metergolina .....	0,5 mg
Excipiente q.s.p .....	55,0 mg

### ■ INDICAÇÕES

CONTRALAC<sup>®</sup> 5 é indicado para a interrupção da lactação de pseudogestação e do pós-parto em cadelas e em gatas.

### ■ POSOLOGIA

Cadelas: 0,1 mg/kg de peso corporal a cada doze horas.  
Gatas: 0,125 mg/kg de peso corporal a cada doze horas.

## ■ MODO DE USAR

Administrar por via oral a dose calculada em função do peso do animal. Para alguns animais que não respondem ao tratamento nos primeiros oito dias, a continuação da terapia por mais quatro a oito dias pode ser necessária.

## ■ EFEITOS ADVERSOS

Vômitos ou diarreia moderados.

Modificação do comportamento (agitação).

Raros casos de intolerância ao medicamento são observados.

Nestas situações recomenda-se a interrupção do tratamento.

## ■ RESTRIÇÕES DE USO

Não administrar o produto à fêmeas gestantes.

Conservar em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

## ■ PRAZO DE VALIDADE

Dois (02) anos após a data da fabricação.

## ■ APRESENTAÇÃO

Blíster aluminizado contendo 8 comprimidos, acondicionado em cartucho com 2 blísteres, acompanhado por uma bula.

Ligue para C.A.S.A.: 0800 13 65 33

Marca registrada® - PRODUTO IMPORTADO

